

Nuevas sugerencias para la utilización adecuada de Equipo de Protección Personal 14/07/2020

- ***EPP para el personal de salud en áreas covid-19: salas de Internación 3° piso, Guardia, UTI, Resonancia, Tomografía, Rayos X, Hemoterapia, Laboratorio***

- Lavado de manos.
- Barbijo quirúrgico durante toda la jornada laboral.
- Barbijo de alta eficiencia o mascarar 3M 6200 (para procedimientos que generen aerosoles).
- Guantes limpios descartables con pacientes sospechosos o confirmados de covid-19.
- Camisolín semipermeable descartable.
- Antiparras y/o mascara facial(escafandra) uso permanente en atención directa o indirecta del paciente.

- ***EPP para el personal de salud en áreas no covid salas de Internación 3°piso D, 1° Piso, 2° Piso, UCO, Guardia, Resonancia, Tomografía, Rayos X, Quirófano, Hemoterapia, Laboratorio***

- Lavado de manos.
- Barbijo quirúrgico durante toda la jornada laboral.
- Guantes limpios descartables según precauciones estándar.
- camisolín re-utilizable, recambio por turno.
- Antiparras y/o mascara facial uso permanente.

Consultorio Externo

- Lavado de manos.
- Barbijo quirúrgico durante toda la jornada laboral.
- Guantes limpios descartables según precauciones estándar.
- No es necesario camisolín.
- Ambo o guardapolvo.
- Antiparras y/o mascara facial(escafandra) uso permanente .

Áreas de administración y Farmacia

- Higiene de manos con agua y jabón o alcohol en gel, antes y luego de salir del trabajo. Durante a jornada laboral, la frecuencia de lavado de manos está relacionada con la cantidad de papel que manipule durante el turno.
- Barbijo quirúrgico durante toda la jornada laboral.
- Antiparras y/o mascara facial uso permanente.

Áreas de Mantenimiento

- Higiene de manos con agua y jabón o alcohol en gel, antes y luego de salir del trabajo.
- Barbijo quirúrgico durante toda la jornada laboral.
- Antiparras y/o mascara facial uso permanente.

Maestranza en sectores covid-19

- Lavado de manos.
- Barbijo quirúrgico durante toda la jornada laboral.
- Doble par de guantes limpios descartables.
- Camisolín semipermeable descartables.
- Antiparras y/o mascara facial(escafandra) uso permanente en atención directa o indirecta de paciente.

Maestranza en sectores no covid.

- Lavado de manos.
- Barbijo quirúrgico durante toda la jornada laboral.
- Guantes de goma (tipo domestico)
- Camisolín re-utilizable, recambio por turno.
- Antiparras y/o mascara facial uso permanente.

Camilleros en sectores covid-19

- Lavado de manos.
- Barbijo quirúrgico durante toda la jornada laboral.
- Guantes limpios descartables con pacientes sospechosos o confirmados de covid-19.
- Camisolín semipermeable descartable.
- Antiparras y/o mascara facial(escafandra) uso permanente en atención directa o indirecta del paciente.

Camilleros en sectores no covid-19

- Lavado de manos.
- Barbijo quirúrgico durante toda la jornada laboral.
- Guantes limpios descartables
- Camisolín re-utilizable, recambio por turno.
- Antiparras y/o mascara facial uso permanente.

Cuidadores

- Serán permitidos solo en situaciones excepcionales.
- Higiene de manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de asistir al paciente, como así también al ingresar y retirarse de la habitación.
- Barbijo quirúrgico.
- Camisolín
- Guantes limpios
- Antiparras o mascara facial.

Camareros

No deben ingresar a las habitaciones con pacientes sospechosos o confirmados de covid-19. Diagramar horarios de entrega de los alimentos que coincidan con el ingreso del personal con otras actividades.

En las áreas no covid deben utilizar:

- Cofia
- Barbijo quirúrgico durante toda la jornada laboral.
- Antiparras o mascara facial.
- Uniforme institucional (ambo).
- Lavado de manos entre paciente y paciente.

NOTA:

Uso de barbijo quirúrgico: está indicado en las siguientes situaciones:

- Persona que asista en forma directa a pacientes con aislamiento por gotas: influenza, coronavirus, virus sincicial respiratorio, meningococo, parotiditis, ruébela.
- Pacientes con infección respiratoria.
- Para procedimientos invasivos que requieren técnica estéril.
- Son descartables.
- Uso extendido hasta 4 horas.
- Se debe realizar higiene de manos antes y después de retirarse el barbijo.
- En caso de traslado de pacientes sospechosos o confirmados de covid-19, tanto el paciente como el personal de salud deben utilizar barbijo quirúrgico.

•Todo personal dentro de la institución debe utilizar barbijo quirúrgico, debido a la etapa de transmisión comunitaria en la que se encuentra Neuquén.

•NO circular dentro de la institución para evitar la propagación de nuevos casos covid-19 a través de los contactos estrechos. (Trasladarse solo si es necesario)

BIBLIOGRAFÍA

1. Nuevas recomendaciones de utilización de EPP día 16 de Junio 2020 Versión 2, del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén.
2. Plan de emergencia institucional COVID-19. Clínica Pasteur, 5 de julio 2020.
3. Elementos de Protección Personal (EPP) para Personal de Salud (PS) frente a casos sospechosos o confirmados SARS CoV-2 Ministerio de Salud Provincia de Neuquén.